1.02.606 Seminar

Krankheitsbilder und Beeinträchtigungen in der NeuroRehabilitation als Brücke zur gesundheitlichen Inklusion

Andreas Zieger

Institut für Sonder- und Rehabilitationspädagogik
CvO Universität Oldenburg

www.a-zieger.de

15. Mai 2019 (3)

„Schlaganfall“ (Hirninfarkt)

„Schlaganfall“ (Hirnfarkt)

Ohne
Schmerzen!

„Stillegung“ durch den Körper

ohne Schmerzen!

Schmerzhaft!

Epidemiologie „Schlaganfall“

Inzidenz: $182/100.000$ Einw/Jahr =
 $150.000 + 15.000$ Rezidive/
Jahr in D (bei 80 Mio Einw)

Prävalenz: $600/100.000$ Einwohner =
 480.000 in D (bei 80 Mio Einw)

- Dritthäufigste Todesursache
- Häufigste Ursache für „erworbene“ dauerhafte Behinderungen und Frühinvalidität!

Morbidität

- Etwa 1 Mio Bundesbürger leben mit den Folgen eines Schlaganfalls
- Nur etwa 40 Prozent der Überlebenden weisen 1 Jahr nach der Erkrankung keine Einschränkungen in den Aktivitäten des täglichen Lebens (ATL) auf.
- Dritthäufigste Ursache für Behinderungen und für vorzeitige Invalidität in Europa.

Risikofaktoren

- Bluthochdruck
- Diabetes mellitus
- Übergewicht; Fettleibigkeit
- Hypertriglyceridämie
- Bewegungsmangel
- Nikotinkonsum
- Emotionaler Stress
- Schlaf-Apnoe-Syndrom
- Alter (nicht modifizierbar!)

Metabolisches
Syndrom

„Tödliches Quartett“

— modifizierbar!

Essen-Stroke-Risk-Score zur Einschätzung des Schlaganfallrezidivrisikos

Risikofaktoren	Punkte
< 65 Jahre	0
65 – 75 Jahre	1
> 75 Jahre	2
Arterielle Hypertonie	1
Diabetes mellitus	1
Myokardinfarkt	1
Andere kardiovaskuläre Ereignisse (außer Myokardinfarkt und Vorhofflimmern)	1
pAVK	1
Raucher	1
Zusätzliche TIA oder Insult zum qualifizierenden Ereignis	1
≥ 3 Punkte: Rezidivrisiko ≥ 4% / Jahr	

Machbar (2009): Therapieleitlinien Schlaganfall. Neurotransmitter 6:49-56

Ätiologie/Ursachen

Thrombose

Hirnregion ohne bzw. mit eingeschränkter Blutversorgung

Thrombus

Embolie

Hirnregion ohne bzw. mit eingeschränkter Blutversorgung

angeschwemmter Embolus

Blutung

ausgetretenes Blut

innere Halsschlagader (Carotis interna)

70-85 Prozent

40-50 Prozent aller Schlaganfälle entstehen durch einen Thrombus.

30-35 Prozent aller Schlaganfälle werden durch einen Embolus ausgelöst, der an einer anderen Körperregion (z.B. im Herzen) entstanden ist.

20-25 Prozent aller Schlaganfälle werden durch einen Riß einer Hirnarterie verursacht.

Schlaganfall-Formen/Typen

Mikroangiopathien

Makroangiopathien

Hämodynamisch
bedingte Infarkte

Territorial-
infarkte

Stromgebiete Hirnarterien

Blutversorgung

vordere - mittlere - hintere Hirnarterien bds.

Hirnblutung

vs.

Hirninfarkt

Art. Basilaris-Thrombose – Locked-in-Syndrom

Arteria Basilaris

Thrombose der Hirnstammarterie

Angiografie

Verschluss
Thrombus

Verschluss

CCT

Akutphase

nach 24 Std.

CCT

Hirnstamminfarkt

PET

Großhirnaktivität für
„Bewusstsein“ (Präcuneus)

Symptome/Beschwerden

Plötzliches Auftreten von

- Schwindel, Übelkeit, Erbrechen
- Schwäche und Sensibilitätsstörungen in einer Halbseite des Körpers/des Gesichts (hängender Arm, Mundwinkel)
- Sprechstörungen, Dysarthrie, Aphasie
- Sehstörungen, z.B. Gesichtsfeldausfall (Hemianopsie)
- Selten: Kopfschmerzen, Nackensteifigkeit (Meningismus) (bei SAB)
- Eintrübung des Bewusstseins, Somnolenz

Hemiparese/plegie

Hirnfarkt,
Blutung

Defizitäre „Zentren“, „Herdneurologie“

Infarkt im Medialstromgebiet links

Überwindung der Lehre von Hirnzentren

Karl Kleist, dt. Neurologe
(1879-1960)

Lokalisationslehre:

Kartierung geistiger Funktionen (1934)

Alexander R. Lurija
sowjet. Neurologe (1902-1977)

Funktionelle Hirnsysteme

mit „Knotenpunkten“ in neuronalen Netzwerken (Informationsverarbeitung)

The Working Brain/Das Gehirn in Aktion:
Einführung in die Neuropsychologie.
Reinbek: Rowohlt (1973/1992)

Regulative Haupteinheiten I-IV

Cytoarchitektonik – Maximum Probability Maps

The Human Connectome

Symptomatik und Lokalisation

Linkshirniger Insult (Art. cerebri media)

- Hemiparese/plegie rechts
- **Aphasie**
- Apraxie
- Agraphie
- Agnosie
- Katastrophen-/Verzweiflungsreaktion
- Angst

Rechtshirniger Insult (Art. cerebri media)

- Hemiparese/plegie links
- **Neglekt** links
- Alien-Hand-Syndrom
- Somatoparaphrenie
- Visuokonstruktive Leistungsstörungen
- Depressives Syndrom
- Anosognosie

Therapie/Rehabilitation

Versorgungsstrukturen

- Stroke-Uni, OP, Intensivstation
- Allgemeinstation
- Frührehabilitation (Phase B)
- Rehazentrum (Phase C,D)
- Nachsorge und Teilhabe (Phase E)
- Langzeitversorgung (ambulant, stationär) (Phase F)

Infarktareal

Sauerstoff

Glukose

Zeit ist Gehirn!

Bilder: Internetabruf

Verlauf, Rückbildung (Remission) und Erholung (Recovery)

3. Tag

18. Tag

Okzipitalinfarkt

Hemianopsie (Gesichtsfeldausfall) links

Art.
Posteriorinfarkt
rechts

Bilder:
Internetabruf

Bilder: Internetabruf

Remissions- und Therapieergebnis

Interventionelle Neuroradiologie

Aneurysma (Kopf):

Gefäßverschließende intraarterielle lokale Verfahren:

- Kathetergestütztes Coiling mit Titanspiralen

Thrombus und Embolie (Gehirn):

Systemische und lokale Gefäßeröffnung < 6 Std. nach Symptombeginn:

- Systemische i.v. und/oder lokale i.a. chemische Thrombusauflösung
- Thrombektomie (u.a. Retriever)

Carotisstenose (Hals):

- Desobliteration (OP)
- Angioplastie (Ballonkatheter), Stenting

prä post

Bilder: Internetabruf

Schwere
SAB

mit
beginnen
dem
Liquor-
aufstau

Hydro-
cephalus

Vermutliches
Aneurysma
als Blutungs-
ursache

Kontrast:
Gantry: -12°
FOV: 230 mm
Zeit: 1000 ms
Schicht: 4.5 mm
Pos.: 87.2
HFS

F: H40s
285 mA
120 kV
Bild-Nr.: 7
Bild 7 von 28

05.01.2013, 20:56:11

Z: 40.0, B: 82.0

Kontrast:
Gantry: -12°
FOV: 230 mm
Zeit: 1000 ms
Schicht: 4.5 mm
Pos.: 96.2
HFS

F: H40s
285 mA
120 kV
Bild-Nr.: 9
Bild 9 von 28

05.01.2013, 20:56:15

Z: 40.0, B: 82.0

Kontrast:
Gantry: -12°
FOV: 230 mm
Zeit: 1000 ms
Schicht: 4.5 mm
Pos.: 123.2
HFS

F: H40s
285 mA
120 kV
Bild-Nr.: 15
Bild 15 von 28

05.01.2013, 20:56:27

P

Z: 40.0, B: 82.0

Kontrast:
Gantry: -12°
FOV: 230 mm
Zeit: 1000 ms
Schicht: 4.5 mm
Pos.: 136.8
HFS

F: H40s
285 mA
120 kV
Bild-Nr.: 18
Bild 18 von 28

05.01.2013, 20:56:31

P

Z: 40.0, B: 82.0

Z: 40.0, B: 82.0

Großes
sack-
förmiges
Aneurysma
der Art.
commun-
icans
anterior
AcomA

1019691
Seq.: *tir2d1_21
Schicht: 5 mm
Pos.: -47.2795
TR: 9000
TE: 114
MZ: 1

HFS
FOV: mm
Bild-Nr.: 10
Bild 10 von 20

03.05.2013, 16:16:48

1019691
Seq.: *tir2d1_21
Schicht: 5 mm
Pos.: -34.2795
TR: 9000
TE: 114
MZ: 1

HFS
FOV: mm
Bild-Nr.: 12
Bild 12 von 20

03.05.2013, 16:16:48

Hirngeweberweichungen nach SAB und OP im Anteriorstromgebiet beidseits

Seq.: *tir2d1_21
Schicht: 5 mm
Pos.: -27.7795
TR: 9000
TE: 114
MZ: 1

HFS
FOV: mm
Bild-Nr.: 13
Bild 13 von 20

03.05.2013, 16:15:09

Seq.: *tir2d1_21
Schicht: 5 mm
Pos.: -8.27949
TR: 9000
TE: 114
MZ: 1

HFS
FOV: mm
Bild-Nr.: 16
Bild 16 von 20

03.05.2013, 16:16:48

Entlastungskraniektomie

Raum-
fordernder
„maligner“
Hirnfarkt

Allgemeine Therapie

Behandlung von „Risikofaktoren“

- Bluthochdruck (art. Hypertonus), Blutzuckererhöhung (Diabetes mellitus), Übergewicht, Fettstoffwechselstörung, Bewegungsmangel, emotionaler Distress
- Stroke Units, Neurologische Frührehabilitation

Resilienzförderung

- Krankheitsverarbeitung

Individuelles Entlass-/Teilhabe-Management

- Selbsthilfe, Nachsorge, Teilhabemaßnahmen ...

Allgemeine Prognose

Individuell **nicht** vorhersagbar, da von **vielen Faktoren abhängig**:

- Größe und Lokalisation des Infarktes
- Alter (Neuroplastizität, Resilienz)
- Co-Morbidität (Alter, Begleitkrankheiten)
- Verlauf unter Therapie und Rehabilitation
- Compliance, Coping, Kohärenz, Resilienz
- Qualität der Nachsorge und Teilhabe
- Kontext: Angehörige, soziales Umfeld
- Bildungs-, ökonomischer und sozialer Status

Exkurs: LIS zur Einführung

Neurowissenschaftliche Grundlagen des Locked-in-Syndroms

Andreas Zieger
Ev. Krankenhaus Oldenburg

Wiss. Filmabend am 12. Juni 2008
CvO Universität Oldenburg

Übersicht

- 1.) Locked-in-Syndrom
- 2.) Ergebnisse einer eigenen Frühreha
Outcome-Studie 1997-2005
- 3.) Selbsterfahrungsberichte („Das Subjekt
als Quelle von Erfahrung“)

1.) Locked-in-Syndrom

**"Ich kann mir keinen Zustand denken,
der mir unerträglicher und schauerlicher wäre,
als bei lebendiger und schmerzerfüllter Seele
der Fähigkeit geraubt zu sein,
ihr Ausdruck zu verleihen."**

**Michel de Montaigne (1533-1592)
(Essais)**

Älteste Beschreibungen

Alexander Dumas (1802-1870)

"Der Graf von Monte Christo“:

Monsieur Noirtier de Villefort wird als
"Leichnam mit den lebenden Augen“
beschrieben.

Emile Zola (1840-1902)

„Thérèse Raquin“, Paris (1867):

„[] blieb sie plötzlich mit klaffendem Mund mitten in einem Satz stecken, als werde sie erwürgt ... nur noch eine halb lebendige Leiche, die sah und hörte, aber nicht sprechen konnte.“

Ursache: Thrombose/Verschluss

Arteria Basilaris

Computertomographie

Thrombosierte
Art. Basilaris

Akutphase

Nach 24 Std.: ausgedehnte
Infarkte von Hirnstamm und
Kleinhirn bds.

Internetdownload

Basilaristhrombose

- Sehr seltenes Ereignis
- Kann akut durch eine Embolie oder durch thrombotische Auflagerungen bei vorbestehender Arteriosklerose entstehen
- Bedeutet ein „Schlaganfall“ im hinteren Stromkreislauf mit Infarzierung im Hirnstamm und/oder Kleinhirn, seltener auch im Großhirn
- Ist unbehandelt mit einer Letalität von 80–90% behaftet
- Inkomplette Formen haben eine bessere Prognose

Locked-In Syndrome

Läsion im ventralen Pons bei erhaltener Aktivität im Cuneus/Präcuneus

Blutung, Blutung

Laureys 2005

Symptome und klinisches Bild

- Beginn mit Schwindel, Übelkeit
- Akut: Bewusstseinsverlust, später: Erwachen und Erleben des Zustandes des „Eingeschlossenseins“
- Vollständige gelähmt, unfähig zu sprechen, zu lächeln, zu schlucken, sich sprachlich oder durch Bewegungen verständlich zu machen.
- Kommunikation lediglich über *vertikale* Augenbewegungen möglich

Therapie und Prognose, früher:

- **Weit verbreitete Unkenntnis** des Krankheitsbildes
- **Defektorientierung:** bleibende Schäden und Behinderungen
- **Therapeutischer Nihilismus:** nichts mehr zu machen
- **„Nicht lebenswert“** (defektmedizinische Prophezeiung und Zuschreibung)
- **Mangelndes Verständnis** von **subjektiv empfundener Lebensqualität** / Prognose

Heute:

- Gute Kenntnisse vom Krankheitsbild
- Thrombolytische Therapie mit Rekanalisation des Verschlusses: Mortalität sinkt auf etwa 50%
- (Vorsorgliche) Stent-Implantation
- Häufig Tracheostoma-Anlage (TK) notwendig
- Intensive mehrmonatige Maßnahmen einer Früh- und Weiterführende Rehabilitation
- Mobilität (Rollstuhl), techn. Kommunikationshilfen
- Ambulante/stationäre Langzeitversorgung mit pflegerischen und therapeutischen Hilfen
- Soziale Reintegration und Teilhabe

Ballondilatation und Stenteinlage

Klein, G.E.: Zeitschrift für Gefäßmedizin 2007; 4(1) 4-10

2.) Ergebnisse einer eigenen Frühreha Outcome-Studie 1997-2005

N=14

Alter im Durchschnitt 55,5 (31-68) Jahre

M=10, F=4

Akutphase

nach 24 Std.

Koma, Vigilanzstörung

Tetraplegie

Dysphagie

Anarthrie

**Blinzeln, vertikale
Augenbewegungen**

Patientin H.B., 56 Jahre

Basilaristhrombose 27.05.1997

Unterstützte Kommunikation mit körpereigenen/körperfremden Hilfen

Vergleich mit anderen Frühreha-Studien

Autor/ Funktion	Schleep 03 N=21	Casanova 03 N=14	Zieger 06 N=14
Motorisch gefähig	19%	21%	42%
Schluck fähig	52%	42%	64%
Gestisch-verbal kommunikabel	62%	28%	79%
Technische Kommhilfe	19%	42%	9%
Mortalität	19%	14%	0%

3.) Selbsterfahrungsberichte

Dr. Karl-Heinz Pantke, Berlin (1999)

„Die Geschichte meiner Krankheit..“

Ereignis/Situation Gefühle

Beginn

Übelkeit, dann Explosion im Kopf
Alptraum, Verlassen des eigenen
Körpers, dissoziative
Körperwahrnehmungen

Notarzt

**Wurde mit den Worten „Exitus“ für tot
erklärt**

Intensivstation

Traum und Realität verschwommen
Gefühl, aus mehreren Personen zu
bestehen, Luftnot, Erstickungsangst
„Ich stand an der Pforte des Todes.“

Ereignis/Situation Gefühle

Frührehabstation fühlte sich gut aufgehoben

Rehabilitation man wollte mir einreden,
dass sich mein gesundheitlicher
Zustand nicht mehr ändern
würde, was auf ihn
traumatisierend, stigmatisierend
und entmutigend wirkte.

Bis heute Quälende Depressionen, Ängste
Zurückgeworfen auf die
„nackte menschliche Existenz.“
**„Der Körper gesundet
schneller, die Psyche vernarbt
langsam .“**

"Ich war bei vollem Bewußtsein, konnte aber keinerlei Kontakt mit der Außenwelt aufnehmen.

Ich war Gefangener meines eigenen Körpers..."

Handschriftliche Notiz von Dr. Pantke:

"Lieber Herr Doktor, da ich mich z.Z. nur schlecht verbal äußern kann, jedoch im Vollbesitz meines Willens bin, gebe ich folgende Erklärung ab: Mir geht es hier sehr gut, und ich möchte hier bleiben, bis ich wieder gehen kann.

Sie haben mir den ersten Schritt aus der Hölle gewiesen, weitere werden folgen..."

Dr. Pantke ist heute Vorsitzender der Berliner Selbsthilfeorganisation LIS e.V.

Weitere Selbsterfahrungsberichte

- Andrea Ostrum (New York): *The 'locked-in' syndrome – comments from a survivor* (1985) In: *Brain Injury* (1994)
„The harder I tried to make people in the hospitals to accept that I was my old self inside, the more I felt as if I were a rat running in circle chasing my own tail...“
- **Jean-Dominique Bauby: *Schmetterling und Taucher glocke* (Frankreich, 1997)**
- Julia Tavalaro: *Bis auf den Grund des Ozeans* (USA, 1997)
- Zebin Gernlach: *War ich nicht tot genug?* (D, 2000)
- Kunibert Geiger: *Das Leben neu lernen. Wie mein Körper Flügel bekam* (Österreich, 2000)
- Nick Chisholm: *Living with locked-in syndrome* (NZ, 2005)
- Anna-Kristin Fronhoff: *Locked-in-Syndrom* (D, 2006)

- Laetitia Bohn-Derrien: **Ich spreche.**
(Frankreich 2005, deutsch 2006)
- Baberkoff/Peters: **Am seidenen Faden**
(USA/Deutschland 2006)

(Filmabend heute)

30 Jahre Langzeitüberleben im LIS!!!

Siegfried Stoll

Gerhard Stoll